



Minister Zdrowia

Warszawa, 29 grudnia 2021

ZPŚ.641.1890.2021.JK

**Komunikat nr 17 Ministra Zdrowia
w sprawie schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19 preparatami
AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna oraz szczepionki COVID-19
VaccineJanssen.**

Minister Zdrowia mając na uwadze aktualne zalecenia Rady Medycznej i Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, w oparciu o stanowisko Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz stanowisko amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), informuje, że **od dnia 3 stycznia 2022 r.** zostają wprowadzone następujące zmiany w realizacji Narodowego Programu Szczepień.

I. W schemacie podstawowym osobom w wieku ≥ 18 lat w celu dokończenia rozpoczętego schematu szczepienia preparatem Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer-BioNTech), lub Vaxzevria (AstraZeneca), gdy zachodzi konieczność zmiany preparatu u pacjenta, niezależnie od zaistniałej przyczyny:

- można podać każdą inną dostępną szczepionkę mRNA, lub szczepionkę Vaxzevria (AstraZeneca) zachowując odstęp ≥ 28 dni między dawkami.

Nadal rekomendowanym schematem podstawowym jest schemat homologiczny z wykorzystaniem jednego preparatu, a w przypadku schematów mieszanych (heterologicznych) rekomendowana jest kolejność:

szczepionka wektorowa - szczepionka mRNA.

Odwrotny schemat mieszany może być zrealizowany w przypadku indywidualnych wskazań do takiego postępowania.

II. W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku ≥ 18 lat zaleca się podanie szczepionki w schematach obejmujących właściwe dawkowanie:

- po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA lub Vaxzevria (AstraZeneca) podanie szczepionki mRNA w odstępie co najmniej 5. miesięcy,
- po szczepieniu szczepionką COVID-19 Vaccine Janssen podanie szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen lub szczepionki mRNA w odstępie co najmniej 2. miesięcy,
- dawka przypominająca szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen może być warunkowo podana jako heterologiczna dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym szczepionką mRNA przeciw COVID-19 z zachowaniem odstępu co najmniej 5 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki:

- **Comirnaty w pełnej dawce 0,3 ml;**

- **Spikevax połowa dawki: 50 μ g - 0,25 ml,**

- **Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen w pełnej dawce 0,5 ml,**

z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zastosowania szczepionki podanej w podstawowym schemacie szczepienia lub zachowaniem kolejności szczepienia po szczepionce wektorowej podania szczepionki mRNA.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik do komunikatu

DAWKA PRZYPOMINAJĄCA				
Ukończony cykl szczepienia	Dopuszczone preparaty	Preferowany preparat	odstęp w dniach	nazwa dawki
Pfizer (2/2)	Pfizer, Moderna 1/2,JJ	Pfizer	150	Przypominająca
Moderna (2/2)	Moderna 1/2 dawki, Pfizer, JJ	Moderna 1/2 dawki	150	Przypominająca
AZ (2/2)	Pfizer, Moderna 1/2 dawki	Pfizer albo Moderna 1/2 dawki	150	Przypominająca
JJ (1/1)	Pfizer/Moderna 1/2 dawki/JJ	Pfizer/Moderna 1/2 dawki/JJ	60	Przypominająca